


Eerste maar niet laatste euthanasie bij transgenders

02/10/2013 | Van onze redactrice Veerle Beel

Voor het eerst kreeg een man die vroeger vrouw was euthanasie. De geslachtsoperatie leverde niet het gewenste resultaat. Volgens de VUB-arts Wim Distelmans lopen er nog aanvragen voor euthanasie onder transgenders.



Wim Distelmans. blg

Nathan Verhelst, die 44 jaar geleden geboren werd als Nancy, kreeg maandag waar hij al maanden o vroeg: euthanasie. De transgender uit Sinaai wilde niet meer leven omdat de geslachtsoperatie die hij twee jaar geleden onderging, niet het gewenste resultaat had opgeleverd.

‘Er was sprake van ondraaglijk fysiek lijden maar ook van een groot psychisch lijden, vanwege een la voorgeschiedenis die tot zijn kindertijd terugging’, zegt Wim Distelmans, de VUB-arts die de euthanasie begeleidde.

Twee psychiaters

De euthanasie is conform de Belgische wetgeving, die de procedure ook toelaat bij niet-terminale aandoeningen, op voorwaarde dat er dan twee bijkomende artsen, onder wie één psychiater, instemmen. In het geval van Nathan waren beide adviserende artsen psychiater.

Jaarlijks krijgen enkele tientallen landgenoten euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden: vorig jaar waren het er 50, op een totaal van 1.430 euthanasiecases, vooral in Vlaanderen. 'Het taboe hier is nog groot', weet Distelmans.

De VUB-arts zegt ook dat er nog enkele aanvragen van transgenders 'in behandeling' zijn.

In het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek van het UZ Gent was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. De meeste geslachtsoperaties voor ons land vinden daar plaats. Ook die van Nathan, bevestigt woordvoester Helga Dekeyzer van het UZ Gent. 'Over dit specifieke geval kunnen wij verder niets zeggen. Behalve dat het geen zwart-witverhaal is.'

Heikel punt

Gisteren publiceerde *Het Laatste Nieuws* zijn laatste interview, waarin de man vertelde over een hoogst ongelukkige kindertijd vol mishandeling en misbruik. Worden transgenders die zich willen laten opereren dan niet nauwkeurig gescreend op psychologisch vlak? 'Dat was in zijn geval een heikel punt', geeft Dekeyzer toe. 'Maar soms worden artsen onder druk gezet, door de patiënt of door zijn omgeving, om zulke *high risk*-patiënten toch te opereren.'

Distelmans voegt eraan toe dat er wel degelijk ook fysiek lijden veroorzaakt was door de operatie, en dat dit 'onherstelbaar' was. Ernstige complicaties komen slechts in 0,8 procent van de operaties voor, aldus nog het UZ.

Welbevinden

Volgens onderzoek van Joz Motmans, van het transgenderinformatiepunt, blijkt dat het welbevinden van transgenders lager is dan gemiddeld onder de bevolking. 'Het risico op sociaal isolement is groot, omdat ze nog niet honderd procent aanvaard worden.'

Enkele choquerende cijfers: twee op drie hebben al aan zelfdoding gedacht en een op de vijf heeft ooit

met familie.

Onderzoek onder transgenders die de operatie ondergingen, laat echter zien dat zij zich net beter voelt zegt Motmans. 'Maar het is duidelijk dat niemand met de afloop van dit verhaal blij kan zijn en dat d voor de hulpverleners die de man probeerden te helpen, ook best zwaar is.'